

“Prevalencia de la violencia familiar en las mujeres integrantes del vaso de leche de Huancayo”

“Prevalence of family violence in women members of the milk glass of Huancayo”

Maravi Baldeón, Layli / Garay Quintana, Soledad / Rojas Carhuamaca, Wilmer
Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional del Centro del Perú

RESUMEN

La violencia familiar en las mujeres en los diferentes estratos es un problema muy álgido y de conocimiento público que se produce cuando el varón abusa de su autoridad, su fuerza física y su poder para maltratarla física, emocional o sexualmente, dándose una gran ventaja, el cual está aceptado por la sociedad; actualmente se le reconoce como un problema de salud pública.

La investigación es de tipo básica, nivel descriptivo, el método utilizado fue el de análisis – síntesis, la población está conformada por las mujeres participantes en el Programa del Vaso de Leche de Huancayo las que están agrupadas en cinco sectores haciendo una población de 5997 usuarias; cuya muestra es de 516 mujeres de cada uno de ellos al azar; las técnicas utilizadas fueron la encuesta y el testimonio.

Las conclusiones a la que arribamos fueron: 1) La prevalencia de la violencia familiar física, psicológica y sexual en las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo es alta; 2) Las diferencias de la violencia familiar son de acuerdo al grado de instrucción son significativas porque a menor grado de instrucción, mayor es la aceptación de la

ABSTRACT

The family violence in women at the different levels is a very height problem and public knowledge that occurs when the man abusing his authority, his strength and power to, abused physically, emotionally or sexually, giving a great advantage, which is accepted by society, it is now recognized as a public health problem.

The research is basic, descriptive level, the method used was the analysis - synthesis, the population consists of women participating in the program Vaso de Leche Huancayo which are grouped into five sectors are making a population of 5997 users ; whose sample is 516 women each randomly; the techniques used were the survey and testimony.

The conclusions that we reached were: 1) The prevalence of physical, psychological and sexual domestic violence in women members of Vaso de Leche on Huancayo city is high; 2) Differences of family violence are according to level of education are significant because a lower level of instruction is greater acceptance of domestic violence by women members of Vaso de Leche on Huancayo city; 3) The strategies used by women members of the Vaso de Leche on Huancayo city to confront family violence are inadequate because they don't seek

violencia familiar por las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo; 3) Las estrategias que utilizan las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo para enfrentar la violencia familiar son inadecuadas porque no buscan ayuda, no denuncian la violencia y son sumisas a la pareja.

Palabras clave: Prevalencia, Violencia familiar, mujer, Vaso de Leche.

help, don't report violence and are submissive to the couple.

Keywords: Prevalence, family violence, woman, Vaso de Leche.

INTRODUCCIÓN

El estudio en particular es sobre la prevalencia de la violencia familiar o conocida también como intrafamiliar que se produce en el lugar que debiera ser el más seguro “el propio hogar”, sin embargo, por razones culturales fue considerada como algo natural y se justificaba como medio disciplinario y correctivo.

La violencia familiar dirigida a la mujer es un tema muy sensible que toca aspectos fundamentales de poder, género y sexualidad. Un balance sobre la situación de las mujeres frente a la violencia familiar nos da saldos negativos, la persistencia de ideas estereotipadas acerca de los roles que deben cumplir los varones y mujeres reproducidos en complejos procesos de socialización donde interactúan un conjunto de actores públicos y privados a diferentes escalas, transmitiendo lo que significa ser varón y mujer, percepciones y valoraciones que van moldeando y reforzando superioridad, ubicando a las mujeres como persona de segunda categoría, dependientes en sus relaciones de pareja así como en la forma de interrelacionarse como ciudadanos. Este estudio contó con la siguiente hipótesis general: La prevalencia de la violencia familiar física, psicológica, sexual que enfrentan las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo es alta, las diferencias de acuerdo a la edad, grado de instrucción son significativas y las estrategias que utilizan para enfrentarla son inadecuadas; siendo las específicas: a) La prevalencia de la violencia familiar

física, psicológica, sexual a la mujer integrante del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo es alta; b) Las diferencias de la violencia familiar de acuerdo a la edad y grado de instrucción son significativas porque a menor edad y grado de instrucción mayor será la aceptación de la violencia familiar, por la mujer integrante del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo; c) Las estrategias que utilizan las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo para enfrentar la violencia familiar son inadecuadas. Está problemática nos hace avizorar lo complejo que es este problema, actualmente está considerada como una enfermedad silenciosa, a menudo oculta y es considerada como problema de la salud pública.

Las integrantes del Vaso de leche por lo general son mujeres que se encuentran en edad fértil, acorde a la ley que la sustenta, salvo algunas excepciones como cuando cobijan a personas en extrema pobreza y entre ellas tenemos mujeres que sufren de violencia familiar en sus diferentes tipos y en diferentes grados que en muchos casos soportan estoicamente, porque de esa manera piensan garantizar el bienestar de sus hijos o la figura del padre.

En este caso en particular encontramos que a menor edad y grado de instrucción hay mayor violencia.

Los objetivos que guiaron la investigación son: Conocer la prevalencia de la violencia familiar física, psicológica, sexual así como identificar las diferencias que existen de acuerdo a las

características de edad, grado de instrucción y determinar las estrategias que utilizan para enfrentar la violencia familiar las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo y los Objetivos específicos son: a. Conocer la prevalencia de la violencia familiar física, psicológica, sexual a la mujer integrante del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo. b. Identificar las diferencias existen de acuerdo a las características de edad y grado de instrucción de la violencia familiar física, psicológica, sexual a la mujer integrante del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo. c. Determinar las estrategias que utilizan las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo para enfrentar la violencia física, psicológica, sexual.


MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación es de tipo básica, nivel descriptivo, el método utilizado fue el de análisis - síntesis, la población está conformada por las mujeres participantes en el Programa del Vaso de Leche de Huancayo las que están agrupadas en cinco sectores haciendo una población de 5997 usuarias; cuya muestra es de 516 mujeres de cada uno de ellos al azar; las técnicas utilizadas fueron la encuesta y el testimonio.

RESULTADO Y DISCUSIÓN

La población de mujeres con las que se trabajó presentaban las siguientes características; todas oscilaban entre 21 a 40 años de edad, el grado de instrucción que tenían entre secundaria completa e incompleta en su mayoría, a su vez también son convivientes, en el estudio encontramos que los diferentes tipos de violencia son altas como es el caso de la violencia física que se da en un 72.1%, la violencia Psicológica en un 64.5% y la sexual en un 78.9%, de lo cual aseveramos que el nivel de violencia hacia ellas es alta siendo un 72.9%, lo cual evidenciamos con el siguiente cuadro

Figura 1.



Afirmando de estos resultados, que a menor edad mayor es la violencia familiar en las mujeres beneficiarias del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo; lo mismo pasa con el grado de instrucción a menor instrucción mayor es la violencia.

Contrastando las hipótesis del estudio:

Contratación estadística de la primera hipótesis específica

Hipótesis:

“La prevalencia de la violencia familiar física, psicológica y sexual en las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo es alta por las actitudes positivas hacia los roles de género”.

Se emplea la prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grande al 95% de confianza estadística.

Hipótesis estadísticas

H_0 : La prevalencia de la violencia familiar Física, psicológica y sexual en las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo no es alta ($H_0: \pi = 0.33$).

H_1 : La prevalencia de la violencia familiar Física, psicológica y sexual en las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo es alta ($H_1: \pi > 0.33$).

La hipótesis alternativa H_1 plantea que si la pre-

valencia de la violencia familiar en las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo es alta, entonces la proporción de mujeres con un nivel alto de violencia (π) debe ser mayor que 0.33 o 33% ($H_1: \pi > 0.33$). El punto de corte de 0.33 se establece en base a la distribución estadística uniforme o rectangular con tres niveles equiprobables de nivel de violencia familiar (bajo, medio y alto), cada uno con probabilidad igual a 1/3.

Estadística de prueba

Dado que la muestra es grande ($n = 516$, $n > 50$), la estadística de prueba es la función Z de Gauss, con distribución normal estándar, definida como:

$$Z = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}}}$$

Aquí, p es la proporción de mujeres (en la muestra) con un nivel alto de violencia familiar, n es el tamaño de muestra.

Regla de decisión

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste unilateral superior o derecho es 1.645, con el cual la hipótesis nula H_0 será rechazada si el valor calculado o muestral de la función Z es mayor que 1.645; en caso contrario, H_0 será aceptada (figura 1). En términos del valor P, la hipótesis nula H_0 será rechazada si el valor P es menor que el nivel de significación usual de 0.05; en caso contrario, H_0 será aceptada.




Figura 2. Regiones de aceptación y rechazo de H_0

Valores calculados

Se observa que $p = 0.729$ y $n = 516$ y, por la hipótesis nula H_0 , $\pi = 0.33$, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se obtiene un valor calculado de 19.26. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un valor P de 0 (tabla 1).

Tabla 1 Prueba de una proporción - Nivel alto de violencia familiar

Prueba de $p = 0.33$ vs. $p > 0.33$

Muestra	X	N	Muestra p	Valor Z	Valor P
1	376	516	0.728682	19.26	0.000

Decisión estadística

El valor calculado de la Z de Gauss (19.26) es mayor que 1.645 (se encuentra en la región de rechazo de H_0) y el valor P (0) es menor que 0,05. Con estas estadísticas, se rechaza la hipótesis nula H_0 y se acepta la hipótesis alternativa H_1 .

Conclusión

Al 95% de confianza estadística, se acepta que la prevalencia de la violencia familiar Física, psicológica y sexual en las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo es alta.

Este resultado coincide con el realizado por la Universidad Cayetano Heredia Facultad de Salud Pública y el Centro de la Mujer Flora Tristán en la ciudad de Lima y Cuzco donde las mujeres enfrentan en mayor porcentaje violencia física y sexual, de igual manera con los reportes de los Centros de Emergencia Mujer, de la ONG. Manuela Ramos y ENDES.

La teoría del aprendizaje de Bandura, señala que en el proceso de desarrollo el individuo adquiere nuevas conductas gracias a la influencia constante del ambiente, lo que en definitiva le permite aprender y sobrevivir en la compleja dinámica de las relaciones sociales a través del proceso vicario y autoregulatorios.

Básicamente las personas adquieren conductas observando los modelos y practicando ellos mismos.

En el caso de la investigación, las mujeres agredidas han vivido en un ambiente violento donde la madre también fue agredida y el castigo físico y psicológico es una acción natural como se constata en los testimonios.

Carmen: Yo siempre fui testigo cuando mi papá pegaba y también insultaba a mi mamá, a mí también me pegaban e insultaban mi papá y mi mamá, yo estoy acostumbrada al golpe.

Norma: Cuando mi marido me insulta y me pega me da cólera pero a todas las mujeres nos pegan y por eso me voy a separar.

Mi padrastro también le pegaba a mi mamá. Desde chiquita me han pegado.

El proceso vicario este referido a la capacidad que tiene el individuo de aprender a partir de las experiencias de otras personas por la observación, siguiendo los modelos vistos en otras personas con los que se identifican.

El modelo ecológico que explica la violencia de: Bronfenbrenner y Belaks está basada en el enfoque sistémico; la violencia surge como consecuencia de una interacción problemática entre el individuo y el entorno que le rodea.

El Micro sistema es el entorno donde se encuentra la familia; es donde se adquieren los primeros modelos y es en este entorno donde se experimenta la violencia, que trae como consecuencia la aceptación de la violencia y esto es reforzado por el Meso sistema que es el entorno inmediato como consecuencia de las redes sociales, el Exosistema donde los medios de comunicación juegan un papel importante, exponiendo de manera incontrolada estereotipos de mujer objeto y el Macro sistema donde las creencias, costumbres promueven la violencia.

Contrastación estadística de la segunda hipótesis específica

Hipótesis:

“Las diferencias de la violencia familiar a la mujer de acuerdo a la edad y grado de instrucción son significativas porque a menor edad y menor grado de instrucción mayor es la violencia fami-

liar en las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de la ciudad de Huancayo”.

La contrastación de esta hipótesis se realiza para ver las diferencias de la violencia familiar según edad y grado de instrucción y se emplea la prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras y al 95% de confianza estadística.

Hipótesis estadísticas

H_0 : No existen diferencias en la violencia familiar en la mujer, según edad, en las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo.

H_1 : Existen diferencias significativas en la violencia familiar en la mujer, según edad, en las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo.

Estadística de prueba

Dado que la muestra es grande ($n = 516$, $n > 50$), la estadística de prueba es la función χ^2 de Pearson, con distribución chi cuadrada, definida como:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^F \sum_{j=1}^C \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Esta función tiene distribución chi cuadrada con $GL = (F-1)*(C-1)$ grados de libertad, donde F es el número de filas y C es el número de columnas de la tabla de contingencia de F filas y C columnas que resumen las variables nivel de violencia familiar y la edad. Dado que en la tabla 12, se ve que $F = 3$ y $C = 4$, la función χ^2 tiene distribución chi cuadrada con 6 grados de libertad.


O_{ij} y E_{ij} son las frecuencias observadas y esperadas correspondientes a las categorías i y j de las variables filas y columnas, respectivamente.

Regla de decisión

El valor teórico de la distribución chi cuadra-

do con 6 grados de libertad para un contraste unilateral superior y 95% de probabilidad es 12.59. Con ello, se rechazará la hipótesis nula H_0 si el valor calculado de la χ^2 de Pearson es mayor que 12.59; en caso contrario, H_0 será aceptada (figura 3). En términos del valor P , se rechaza la hipótesis nula H_0 si el valor P es menor que el nivel de significación de 0.05; en caso contrario, H_0 será aceptada.

Figura 3 Regiones de aceptación y rechazo de H_0



Valores calculados

El programa estadístico SPSS v_22 reporta un valor calculado de la chi cuadrada de Pearson de 18.875 y un valor P de 0.004 (tabla 2).

Estadísticos	Valor	gl	Sig. sintónica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	18.875	6	.004
Razón de verosimilitud	11.715	6	.069
Asociación lineal por lineal	1.909	1	.167
N de casos válidos	516		

Tabla 2 Pruebas chi cuadrado - Nivel de violencia familiar y edad

Decisión estadística

Como el valor calculado de la chi cuadrada (18.875) es mayor que 12.59 (se encuentra en la región de rechazo de la hipótesis nula H_0), se rechaza la hipótesis nula H_0 , a favor de la hipótesis alterna H_1 . Asimismo, el valor P (0.004) es menor que el nivel de significación habitual de 0.05, con el cual se ratifica la decisión anterior.

Conclusión

Al 95% de confianza estadística, se acepta que existen diferencias significativas en la violencia familiar en la mujer, según edad, en las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de

Huancayo; por lo que se acepta la segunda hipótesis específica de la investigación.

Diferencias de la violencia familiar a la mujer según grado de instrucción

Hipótesis estadísticas

- H_0 : No existen diferencias en la violencia familiar en la mujer, según grado de instrucción, en las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo
- H_1 : Existen diferencias significativas en la violencia familiar en la mujer, según grado de instrucción, en las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo.

Estadística de prueba

Dado que la muestra es grande ($n = 516$, $n > 50$), la estadística de prueba es la función χ^2 de Pearson, con distribución chi cuadrada, definida como:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^F \sum_{j=1}^C \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Esta función tiene distribución chi cuadrada con $GL = (F-1)*(C-1)$ grados de libertad, donde F es el número de filas y C es el número de columnas de la tabla de contingencia de F filas y C columnas que resumen las variables nivel de violencia familiar y el grado de instrucción. Dado que en la tabla 12, se ve que $F = 3$ y $C = 4$, la función χ^2 tiene distribución chi cuadrada con 6 grados de libertad.


O_{ij} y E_{ij} son las frecuencias observadas y esperadas correspondientes a las categorías i y j de las variables filas y columnas, respectivamente.

Regla de decisión

El valor teórico de la distribución chi cuadrada con 6 grados de libertad para un contraste unilateral superior y 95% de probabilidad es 12.59. Con ello, se rechazará la hipótesis nula H_0 si el valor calculado de la χ^2 de Pearson es

mayor que 12.59; en caso contrario, H_0 será aceptada (figura 21). En términos del valor P, se rechaza la hipótesis nula H_0 si el valor P es menor que el nivel de significación de 0.05; en caso contrario, H_0 será aceptada.

Figura 4. Regiones de aceptación y rechazo de H_0



Valores calculados

El programa estadístico SPSS v_22 reporta un valor calculado de la chi cuadrada de Pearson de 52.372 y un valor P de 0 (tabla 16 y figura 20).

Tabla 3 Pruebas chi cuadrado - Nivel de violencia familiar y edad

Estadísticos	Valor	gl	Sig. sintónica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	52.372	6	.000
Razón de verosimilitudes	23.131	6	.001
Asociación lineal por lineal	2.540	1	.111
N de casos válidos	518		

Decisión estadística

Como el valor calculado de la chi cuadrada (52.372) es mayor que 12.59 (se encuentra en la región de rechazo de la hipótesis nula H_0), se rechaza la hipótesis nula H_0 , a favor de la hipótesis alterna H_1 . Asimismo, el valor P (0) es menor que el nivel de significación habitual de 0.05, con el cual se ratifica la decisión anterior.

Conclusión

Al 95% de confianza estadística, se acepta que existen diferencias significativas en la violencia familiar, según grado de instrucción, en las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo. Por lo que se acepta la segunda hipótesis específica de la investigación.

Los resultados muestran que a menor edad y menor grado de instrucción mayor es la violencia física, psicológica y sexual coincidiendo con la investigación realizada por la OMS sobre violencia de pareja y la salud de las mujeres realizado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde el nivel de escolaridad de las mujeres que sufren violencia en el Cuzco es bajo, el 55.4% tiene solo primaria o es analfabeta.

El modelo ecológico señala que existen factores que influyen en la probabilidad de experimentar o cometer violencia, en este caso el factor sería a nivel de la comunidad referido a la influencia de valores, costumbres y dinámica de organización comunitaria que establecen y refuerzan la condición deficitaria y de subestimación de la mujer que aumentan el riesgo que los hombres cometan actos de violencia y el riesgo que las mujeres lo experimenten.

Luzmila, manifiesta, en casa éramos 8 hermanos y todos no podíamos ir a la escuela, mi mamá daba preferencia a mis hermanos.

Carmen: Yo sólo estudie hasta quinto grado, no me gustaba estudiar, no tenía buenas notas y mi hermana dejó que ya no estudie.

La falta de oportunidades es un factor de riesgo, por eso se deben reforzar los factores protectores que apoyaran la resiliencia de las mujeres y el empoderamiento.

Contrastación estadística de la tercera hipótesis específica

Hipótesis:

“Las estrategias que utilizan las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo para enfrentar la violencia familiar son inadecuadas porque no buscan ayuda, no denuncian la violencia y son sumisas a la pareja”.

Nivel de estrategias de enfrentamiento a la violencia familiar

Hipótesis estadísticas

H_0 : Las estrategias que utilizan las mujeres

integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo para enfrentar la violencia familiar no son inadecuadas ($H_0: \pi = 0.5$).

H_1 : Las estrategias que utilizan las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo para enfrentar la violencia familiar son inadecuadas ($H_1: \pi > 0.5$).

La hipótesis alternativa H_1 plantea que si las estrategias que utilizan las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo para enfrentar la violencia familiar son inadecuadas, entonces la proporción de mujeres con esta clase de estrategias (π) debe ser mayor que 0.5 o 50% ($H_1: \pi > 0.5$). El punto de corte de 0.5 se establece en base a la distribución estadística uniforme o rectangular con dos clases equiprobables de estrategias de enfrentamiento a la violencia familiar (inadecuadas y adecuadas), cada una con probabilidad igual a 1/2.

Estadística de prueba

Dado que la muestra es grande ($n = 516$, $n > 50$), la estadística de prueba es la función Z de Gauss, con distribución normal estándar, definida como:

$$Z = \frac{\hat{p} - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}}}$$

Aquí, p es la proporción de mujeres (en la muestra) con estrategias inadecuadas de enfrentamiento a la violencia familiar, n es el tamaño de muestra.

Regla de decisión

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste unilateral superior o derecho es 1.645, con el cual la hipótesis nula H_0 será rechazada si el valor calculado o muestral de la función Z es mayor que 1.645; en caso contrario, H_0 será aceptada (figura 5). En términos del valor P, la hipótesis nula H_0 será rechazada si el valor P es menor que el nivel de significación usual de 0.05; en caso contrario, H_0 será aceptada.


Valores calculados

En la tabla 25 se observa que $p = 0.653$ y $n = 516$ y, por la hipótesis nula H_0 , $\pi = 0.5$, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se obtiene un valor calculado de 6,96. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un valor P de 0 (figura 24).

Tabla 4 Prueba de una proporción - Estrategias inadecuadas

Prueba de $p = 0,5$ vs. $p > 0,5$					
Muestra	X	N	Muestra p	Valor Z	Valor P
1	337	516	0.653101	6.96	0.000

Figura 5 Regiones de aceptación y rechazo de H_0



Decisión estadística

El valor calculado de la Z de Gauss (6.96) es mayor que 1.645 (se encuentra en la región de rechazo de H_0) y el valor P (0) es menor que 0.05. Con estas estadísticas, se rechaza la hipótesis nula H_0 , a favor de la hipótesis alternativa H_1 .

Conclusión

Al 95% de confianza estadística, se acepta que las estrategias que utilizan las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo para enfrentar la violencia familiar son inadecuadas. Por lo que se acepta la tercera hipótesis específica de la investigación

Estos resultados son semejantes a los obtenidos en la investigación: Violencia Sexual y Física contra las mujeres en el Perú realizado por la OMS.

Las mujeres utilizan diversas formas de enfren-

tar la violencia, como la autodefensa, la separación temporal o definitiva y el buscar apoyo; en esta investigación encontramos que el mayor porcentaje utiliza como estrategia la autodefensa; y en menor porcentaje buscan ayuda.

En nuestra investigación tampoco buscan ayuda, no denuncian y son sumisas.

El modelo ecológico señala, cuando las normas sociales son condescendientes, cuando se tolera el control masculino y se acepta la violencia como método de resolución de conflictos, se contribuye a crear un clima en el que se propicia la violencia.

Se debe resaltar también la atención inadecuada de los casos de violencia que trae como consecuencia el aislamiento de las mujeres en la comunidad familiar y la impunidad de los agresores.

Carmen: Cómo voy a denunciar, sería peor, mis hijos sufrirían y me echarían la culpa.

Raquel: Yo, una vez lo denuncié pero mi familia me crítico, su familia me amenazó.

María: A mi mamá, mi papá le pegaba y ella nunca lo denuncio, siempre hay peleas, así es la vida.

Bandura: explica que el aprendizaje se realiza mediante la observación de los comportamientos de los demás, esto no debe confundirse con la imitación.

La conducta aprendida no se realiza en presencia del sujeto del que se aprende sino de manera diferida en el tiempo, algunos factores condicionan el resultado del aprendizaje observacional y son las características del observador, como edad, nivel intelectual, tipo de personalidad. En este caso tenemos a las mujeres que han vivido en un entorno violento y tiene el refuerzo de la sociedad donde no hay equidad de género.

Contrastación estadística de la hipótesis general

Hipótesis:

"La prevalencia de la violencia familiar física, psicológica y sexual que enfrentan las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo es alta, las diferencias de la violencia familiar de acuerdo a la edad y grado de instrucción son significativas y, las estrategias que utilizan para enfrentar la violencia familiar son inadecuadas".

Esta hipótesis es la síntesis o resumen de las tres hipótesis específicas, por lo que, al haber sido aceptada las tres hipótesis específicas, se acepta la hipótesis general de investigación. Por lo que se acepta la hipótesis general.

CONCLUSIONES:

1. La prevalencia de la violencia familiar física, psicológica y sexual en las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo es alta
2. Las diferencias de la violencia familiar de acuerdo al grado de instrucción son significativas porque a menor grado de instrucción mayor es la aceptación de la violencia familiar por las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de la ciudad de Huancayo.
3. Las estrategias que utilizan las mujeres integrantes del Vaso de Leche de la ciudad de Huancayo para enfrentar la violencia familiar son inadecuadas porque no buscan ayuda, no denuncian la violencia y son sumisas a la pareja.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alberdi, I. y Matas, N. (2002) La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España. Colección Estudios Sociales -Fundación La Caixa. (PDF)
2. Barcaglione, Gabriel; (2005) Chejter, Silvia; Fontenla, Marta. Feminicidio e impunidad. Argentina: CECYM.
3. Bernardes A. ed. (2001) *Violencia de género y sociedad: una cuestión de poder*. Recopilación de ponencias del Universidad de Verano de El Escorial. España.
4. Carozzo, J. (2001). Violencia y Conciliación en la Agenda Familiar y Escolar .Lima Perú. Laymar e.i.r.l.
5. CEDAW, (2005) Informe de México producido por el Comité para la cedaw (Resultados y recomendaciones sobre la abducción, violación y crimen de mujeres en Ciudad Juárez).México D.F, México.
6. PROMUDEH - OPCIÓN. (2000)Violencia Familiar Desde una Perspectiva de Género: consideraciones para la acción. Lima - Perú. Laymar e.i.r.l.
7. OMS (2013). Violencia contra la mujer, violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer.
8. ONU (2013). Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.
9. ONU MUJERES (2014). Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra las mujeres y niñas.
10. Revista médica de Chile. (2001). Violencia conyugal en la ciudad de Temuco. Un estudio de prevalencia y factores asociados. V 129 n.12 Santiago dic.